



Утверждаю
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
Е.А. Непоклонов

16 ИЮЛ 2012

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Геомицина® Ф для профилактики и лечения послеродового эндометрита и других воспалительных заболеваний матки у коров (организация-разработчик: «GENERA Inc.», Хорватия)

I. Общие сведения

1. Торговое название лекарственного препарата: Геомицин® Ф (Geomycin® F)
Международное непатентованное наименование: окситетрациклина гидрохлорид.
2. Лекарственная форма: таблетка для внутриматочного применения.
Геомицин® Ф в 1 таблетке (19 г) в качестве действующего вещества содержит 1,0 г окситетрациклина гидрохлорида, а в качестве вспомогательных веществ - 6,5 г виннокаменной кислоты, 7 г углекислого натрия, 0,5 г желатина, 0,125 г стеарата магния, 0,75 г талька, 0,075 г полиоксиэтиленцетила эфира, 0,008 г кокосового масла и кукурузный крахмал – до 19 г.
По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой продолговатые таблетки светло-желтого цвета, при контакте с водой образующие обильную пену.
3. Геомицин® Ф выпускают расфасованным по 1 таблетке в блистере из фольги, вместе с силикагелем (для поглощения влаги). Блистеры упаковывают по 10 штук в картонные коробки и снабжают инструкцией по применению.
4. Геомицин® Ф хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, вдали от нагревательных приборов, при температуре от 8°C до 15°C.
Срок годности Геомицина® Ф при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства.
Запрещается применение Геомицина® Ф по истечении срока годности.
5. Геомицин® Ф хранят в местах, недоступных для детей.
6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Геомицин® Ф - антибактериальный лекарственный препарат тетрациклиновой группы.
Окситетрациклина гидрохлорид, входящий в состав лекарственного препарата относится к антибиотикам тетрациклинового ряда, механизм действия которого заключается в блокаде синтеза протеинов в микробной клетке и нарушении процесса деления.
Окситетрациклина гидрохлорид, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром антибактериального действия, подавляет рост и развитие большинства грамм-положительных и грамм-отрицательных микроорганизмов, в том числе стрептококков, стафилококков, эшерихий, сальмонелл, пастерелл, клостридий, актинобактерий, а также некоторых видов микоплазм, риккетсий, хламидий и простейших.

При контакте Геомицина® Ф с экссудатом матки образуется обильная пена, содержащая двуокись углерода, что обеспечивает равномерное проникновение антибиотика по всей полости матки. Двуокись углерода способствует проникновению окситетрациклина в глубокие слои слизистой оболочки матки, механическому очищению поверхности эндометрия и усилению сократительной способности матки.

Всосавшийся из матки окситетрациклина гидрохлорид выводится из организма в основном с мочой и желчью, у лактирующих животных - частично с молоком.

Геомицин® Ф по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

8. Геомицин® Ф применяют для лечения и профилактики болезней бактериальной этиологии матки у коров после оказания родовспоможения, кесарева сечения, оперативного отделения последа, послеродового эндометрита.

9. Геомицин® Ф запрещается применять животным при индивидуальной повышенной чувствительности к лекарственному препарату.

10. Геомицин® Ф применяют внутриматочно. Перед введением лекарственного препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов и корня хвоста и проводят легкий массаж матки в течение 1-2 минут. При необходимости, перед введением лекарственного препарата полость матки освобождают от гнойного экссудата (при пиометре, гнойных и гнойно-катаральных эндометритах).

С профилактической целью Геомицин® Ф вводят однократно или двукратно (с интервалом 24 часа), в дозе 1 таблетка на животное.

С лечебной целью Геомицин® Ф вводят в течение 3-5 суток с интервалом 24 часа в дозе 1-2 таблетки на животное.

11. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

12. Особенности действия лекарственного препарата при первом применении или при его отмене не установлено.

13. При пропуске одной или нескольких доз препарата лечение необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренной дозировке и схеме применения.

14. При применении Геомицина® Ф в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений не установлено.

15. Запрещается одновременное применение Геомицина® Ф с лекарственными препаратами, содержащими антибиотики группы пенициллинов и цефалоспоринов.

16. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 10 суток после последнего введения лекарственного препарата. Мясо животных, вынужденно убитых ранее установленного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Запрещается использование в пищевых целях молока, полученного в период лечения и в течение 96 часов после последнего введения Геомицина® Ф. Молоко, полученное до истечения указанного срока, может быть использовано после термической обработки для кормления животных.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Геомицином® Ф следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Геомицином® Ф.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые коробки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: «GENERA Inc.», Svetonedjeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Croatia.

Адрес места производства: Svetonedjeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Croatia.

Инструкция разработана компанией «GENERA Inc.», Хорватия.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Геомицина Ф, утвержденная Россельхознадзором 17 мая 2010 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения 191-3-3.0-0884 № ПВУ-3.-3.0/03137